



Septasol

Händedesinfektion



Hygienische und chirurgische Händedesinfektion

- Alkoholisches Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion.
- Parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen.
- Sehr gute Hautverträglichkeit

Anwendungsbereiche

- Hygienische Händedesinfektion gem. VAH/DGHM/EN1500
- Chirurgische Händedesinfektion gem. VAH/DGHM/EN 12791

Mikrobiologische Wirksamkeit

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV, HCV, Rota-, Vaccinia-, Noro-Viren)

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

- 2-Propanol: 63,1 g
- gereinigtes Wasser

Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.
Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 1,5 Minuten lang feucht gehalten.

Gutachten

PD Dr. med. F.-A. Pitten, Gießen:

Gutachten zur Hände- und Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

Prof. Dr. med. habil. Kramer, Greifswald:

Gutachten zur Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

Dr. Steinmann, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV und Vaccinia-Virus nach RKI/DVV Leitlinie.

Listung und Zulassung

- Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM.

Besondere Hinweise

Entzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten-Nicht rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Desinfektionsmittel vorsichtig sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lieferformen Gebinde

- 1000 ml Vakuumbbeutel
- 1000 ml Spenderflasche



Hygienische Händedesinfektion

Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500

1




Handfläche auf Handfläche, zusätzlich gegebenenfalls die Handgelenke

2



Rechte Handfläche über linkem Handrücken – und umgekehrt

3



Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern

4




Außenseite der verschränkten Finger auf gegenüberliegende Handflächen

5



Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche – und umgekehrt

6



Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche – und umgekehrt

Bei der hygienischen Händedesinfektion das Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben und über 30 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken einreiben. Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal durchführen. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden einzelne Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt.

Diese Information und alle weiteren technischen Ratschläge basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen. Das schließt mit ein das keine Haftung oder Verantwortung unsererseits besteht. Miscea Produkte unterliegen dem Urheberrecht. Verstöße gegen das geistige Eigentum eines Dritten haben strafrechtliche Folgen, besonders in dem Bezug auf die Patentrechte. Insbesondere sind keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien für die Produkteigenschaften gewährleistet. Wir behalten uns das Recht vor jederzeit Veränderungen, in Bezug auf die technische Entwicklung und weitere Veränderungen, vorzunehmen. Der Kunde ist nicht von der Pflicht befreit eine sorgfältige Prüfung der einkommenden Ware durchzuführen.